



Luxación de codo

Varón de 30 años con luxación de codo derecho tras caída casual en moto de motocross el 08-09-24.

Le reducen el codo en Urgencias tras comprobar en Rx ausencia de fractura.

El paciente con brazo en cabestrillo nos dice que tiene un importante dolor. Tiene un edema y hematoma en todo el brazo severo.

Para combatir este dolor el médico le receta analgesia mediante AINEs cada 8 horas.



Una vez analizando el informe de la radiografía y las señales que nos da el paciente decidimos aplicarle el siguiente tratamiento.

- Tratamiento del traumatismo articular agudo:
 - 1^a sesión: 11-09-24
 - 2^a sesión: 16-09-24, ya trabajando.
 - 3^a sesión: 25-09-24, retira el cabestrillo.

Protocolo de tratamiento fase aguda

Modo operativo	Minutos
L Ext H Intra H	10 min
PC Noc H	5 min
BS Joint Tissue	5 min

Nuestro primer objetivo se centro en hacer desaparecer el edema y hematoma para liberar esa presión en la zona, trabajar en disminuir el dolor y trabajar en la bioestimulación del tejido articular.



Después de estas sesiones pasamos a trabajar sobre la lesión, ahora ya en otra fase que es la subaguda.

Para ello realizamos el siguiente protocolo de tratamiento:

Protocolo de tratamiento fase subaguda

Modo operativo	Minutos
L	
Ext H	5 min
Intra H	
PC	
Noc M	10 min
BS	
Joint Tissue	5 min
BS	
Cartilage/Bone	5 min

En esta fase aumentamos el tejido a tratar metiendo en el tratamiento la bioestimulación de cartílago y hueso.

Después de esta 4^a sesión realizada 02-10-24, ya conduce y no toma AINEs.



En la 5^a sesión el 08-10-24 mantenemos el protocolo de tratamiento anterior y obtenemos aún mayor mejoría tanto en dolor como en la movilidad del codo.



En la 6^a sesión el 15-10-24, el paciente esta sin dolor a la movilidad activa y en su trabajo.



Pasados 15 días decidimos realizar un protocolo de secuelas de traumatismos articulares, realizamos 2 sesiones con el siguiente protocolo:

Protocolo de tratamiento en secuelas de traumatismo

Modo operativo	Minutos
PC Noc M	5 min
BS Joint Tissue	5 min
BS Cartílago/Bone	5 min
L Ext L Intra H	5 min

En la 7^a sesión del 28-10-24, mejor movilidad y sin dolor.

Y en la 8^a sesión realizada el 13-11-24 movilidad completa y realizando su trabajo con normalidad.



“Trabajar con la bomba diamagnética es un privilegio, puede abordar cualquier patología dando igual la fase en la que se encuentre. La especificidad que te da para tratar cada tejido de manera independiente hace que los procesos curativos sean más rápido y eficientes”

