

Caso clínico: Úlcera en el pie Derecho

Úlcera en el pie a la altura de base 5º metatarsiano. Aparece en junio 23 y está a tratamiento con enfermería (nitrato de plata y acolchado), nunca llega a cerrar.

El paciente sufre un gran dolor al intentar ponerse en bipedestación. Con ello pierde calidad de vida y capacidad de realizar acciones como asearse, vestirse...

Acude a nuestro centro y decidimos aplicar la Bomba Diamagnética.

1 sesión (02 oct 24)

- Herida por presión Grado II
- Pérdida parcial espesor de la piel
- Herida si infección
- Bordes eritematosos y secos
- Área de la lesión edematosa y muy dolorida



Tratamiento

- Pain Control Noci H 10 ´
- Membrana 5 ´ y vascular 5 ´
- Extra H e Intra H 10 ´

En la sesión con la bomba nos permite trabajar en 3 cosas claves para poder dar solución al paciente, el dolor, el tejido dañado y desplazamiento de líquidos para rebajar el edema.

2 sesión (09 oct 24)

En la segunda sesión observamos con ciertas mejorías:

- Epitelización parcial
- Bordes menos eritematosos
- Reducción del edema del área



Viendo que el protocolo de la primera sesión estaba resultando efectivo realizamos mismo protocolo en esta segunda sesión.

Tratamiento

- Pain Control Noci H 10 ´
- Membrana 5 ´ y vascular 5 ´
- Extra H e Intra H 10 ´

3 sesión (16 oct 24)

Acude por 3 vez al centro pasados 14 días la ulcera presenta un estado muy favorable, se observa como comienza su cicatrización y una reducción de dolor considerable:

- Epitelización avanzada
- Reducción del lecho de la herida y sequedad
- Reducción considerable del dolor
- El paciente ya puede calzarse y puede hacer bipedestación.



En está sesión variamos el protocolo ya que los reportes del paciente y el estado de la ulcera avanzan de una manera positiva

Tratamiento

- Intra H y extra L 10 ´
- Membrana 5 ´ y vascular 5 ´
- Pain Control Noci L 5 ´

4 sesión (23 oct 24)

En esta visita notamos ya como la ulcera empieza a cerrarse:

- Epitelización
- Cierre casi total herida



Tratamiento

- Intra H y extra L5 ´
- Membrana 5 ´ y vascular 5 ´
- Pain Control Noci L 5 ´

5 sesión y ultima (06 nov 24)

El paciente nos comenta que ya no tiene dolor y que la ulcera está cerrada por completo:

- Cierre completo
- Sin dolor en carga
- Aumento de la sequedad de la piel



Tratamiento

- Intra H y extra L5 ´
- Membrana 5 ´ y vascular 5 ´
- Noci L 5 ´

Ajustamos el tratamiento para trabajar la zona, notamos sequedad en la piel y le recomendamos que use una crema hidratante.

Conclusiones:

“Hemos resuelto una úlcera en 1 mes que venía de mucho tiempo atrás. El paciente pudo volver a su bipedestación y realizar su vida con normalidad. Ya sabemos que estos casos son difíciles de resolver, ya que este tipo de heridas nunca llegan a cerrar y el paciente suele tener recaídas o empeoramientos.

Esto ha sido posible por la Bomba diamagnética, gracias a sus mecanismos individualizados para tratar cada parte de una manera diferente y la posibilidad de trabajar sin contacto con la piel, marca la diferencia.”

Carlos Eiras